

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Дозировка и способ применения

Строго для местного применения в ротовой полости.
Этот стоматологический гель содержит высокое количество ионов фтора.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Осторожно удалить все губные отложения.
Изолировать зубы с помощью ватных валиков. Высушить зубы теплым воздухом, уделяя особое внимание окклюзионным и проксимальным поверхностям.
Нанести ФЛЮОКАЛЬ ГЕЛЬ на поверхность всех зубов и оставить на 4 минуты.
После обработки попросить пациента сплюнуть излишки геля и порекомендовать ему ни пить, ни есть, ни полоскать рот в течение, по меньшей мере, 30 минут.

Частота и время применения

Пациенты со средней степенью предрасположенности к возникновению кариеса могут проходить лечение ФЛЮОКАЛЬ ГЕЛЕМ один раз в год. Пациенты с повторяющимся кариесом должны повторять лечение каждые 6 месяцев.

Длительность лечения

По назначению врача

Передозировка

В случае проглатывания больших количеств геля проконсультироваться у специалиста.
При массивных дозах госпитализироваться.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ)

КАК ЛЮБОЙ ДРУГОЙ АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ, ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ НА НЕКОТОРЫХ ПАЦИЕНТАХ ВЫЗВАТЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ НЕПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ.

Случайное проглатывание геля в больших количествах может вызвать тошноту и рвоту.

ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ СТОМАТОЛОГУ И СООБЩИТЕ ЕМУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ И НЕПРИЯТНЫХ РЕАКЦИЯХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УПОМЯНУТЬ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ.

РУ № ФСЗ 2011/09767 от 24/05/2011

Fluocal

Dental gel for topical application

Qualitative and quantitative composition

SODIUM FLUORIDE 2.71 g
Excipients: phosphoric acid, saccharin, alcohol, xanthan gum, purified water.
in 100 ml of gel
100 ml of gel contain 1.23 g of active fluorine.

Dosage form

Dental gel for topical application – bottle containing 125 g.

Pharmaco-therapeutic class

STOMATOLOGY / PROPHYLACTIC AGENTS OF DENTAL CARIES
(A: digestive tract and metabolism)

Manufacturer's name and address

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Uses (therapeutic indications)

Prevention of dental caries, particularly in patients with a risk of rampant caries.

WARNING !

Not to be used in case of (contraindications)

This medicine SHOULD NOT BE USED in the following cases:

- hypersensitivity to any component of FLUOCAL gel,
- in children, due to the high content in fluorine, the presence of alcohol and the method of administration.

IN CASE OF A DOUBT, REFER TO YOUR DENTIST OR STOMATOLOGIST.

Precautions for use

DO NOT SWALLOW
IN CASE OF A DOUBT, REFER TO YOUR DENTIST OR STOMATOLOGIST.

Drug interactions and other interactions

- calcium salts

IN ORDER TO PREVENT POTENTIAL INTERACTIONS BETWEEN MISCELLANEOUS DRUGS, ANY OTHER ONGOING TREATMENT MUST BE SYSTEMATICALLY MENTIONED TO YOUR DENTIST OR STOMATOLOGIST.

Pregnancy and lactation

AS A GENERAL RULE, IT IS ADVISABLE, DURING PREGNANCY OR LACTATION TO ALWAYS ASK YOUR DENTIST OR STOMATOLOGIST FOR ADVICE BEFORE TAKING ANY MEDICATION

List of the excipients, the knowledge of which is required to be used safely in certain patients

Ethyl alcohol 96 %.



HOW TO USE THIS MEDICINE

Posology and method of administration

For local use in the mouth only

This dental gel has a high content in fluorine ions.

FOR ADULTS ONLY

Remove carefully all tartar.

Isolate the teeth with cotton wool rolls. Dry the surfaces to be treated with warm air, paying particular attention to the occlusal and proximal areas.

Apply FLUOCAL gel on the total surface of all teeth and keep it in contact with the teeth for 4 minutes.

After treatment, ask the patient to expectorate any excess gel from his mouth and instruct him not to eat, drink or rinse his mouth for at least 30 minutes.

Frequency and moment when the medicament should be administered

In adults, one treatment a year is sufficient for patients with an average incidence of caries. In highly "caries-prone" patients, the treatment should be carried out every six months.

Duration of treatment

Conform to the medical prescription

What to do in case of overdose

In case of excessive ingestion of gel, consult a doctor.

For massive doses, go to hospital.

UNWANTED AND DISCOMFORTABLE EFFECTS (SIDE EFFECTS)

LIKE ANY OTHER ACTIVE INGREDIENT, THIS MEDICINE MAY, IN SOME PATIENTS ENTAIL MORE OR LESS BOTHERSOME EFFECTS.

Accidental ingestion of important quantities of gel may cause nausea and vomiting.

DO NOT HESITATE TO REFER TO YOUR DENTIST OR STOMATOLOGIST AND TELL HIM ANY UNWANTED OR DISCOMFORTABLE EFFECT THAT WOULD NOT BE MENTIONED IN THE LEAFLET.

STORAGE

DO NOT USE AFTER THE EXPIRY DATE MENTIONED ON THE OUTER PACKAGE.



ФЛЮОКАЛЬ

Гель для местного применения

Качественный и количественный состав

Фтористый натрий 2,71 г
Наполнитель: фосфорная кислота, сахарин, спирт, ксантановая камедь, очищенная вода.
100 мл геля содержат 1,23 г активного фтора.

Лекарственная форма

Гель стоматологический для местного применения – флакон 125 г.

Фармакотерапевтическая группа

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗУБНОГО КАРИЕСА
(А: пищеварительный тракт и метаболизм)

Название и адрес производителя

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Применение (терапевтические показания)

Профилактика кариеса, в частности, у пациентов с прогрессирующим кариесом.

ВНИМАНИЕ!

Противопоказания

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данный препарат в следующих случаях:

- Гиперчувствительность к одному из компонентов состава,
- Детям, по причине высокого содержания фтора, наличия в составе спирта, а также из-за способа применения.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ ОБРАТИТЕСЬ К СТОМАТОЛОГУ.

Предосторожности при применении

НЕ ГЛОТАТЬ

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ ОБРАТИТЕСЬ К СТОМАТОЛОГУ.

Взаимодействия с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

– Соли кальция

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА НЕСОВМЕСТИМОСТИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕДИТЕ ВАШЕГО СТОМАТОЛОГА О ПРИНЯТИИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Беременность и лактация

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ ЛАКТАЦИИ (ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ) СЛЕДУЕТ ВСЕГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К СТОМАТОЛОГУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ КАКИХ-ЛИБО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Список компонентов, знание о наличии которых обязательно для безопасного применения на некоторых пациентах.

Этиловый спирт 96%