

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материала профилактического для ускоренной реминерализации
и снижения чувствительности твердых тканей зуба

«Десенсил®-Актив»

ТУ 9391-135-45814830-2012

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал профилактический для ускоренной реминерализации и снижения чувствительности твердых тканей зуба **«Десенсил-Актив»** (далее по тексту – **гель «Десенсил-Актив»**) позволяет быстро снизить как имеющуюся гиперчувствительность зубов, так и гиперчувствительность дентина, вызванную проведением стоматологических процедур.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав геля **«Десенсил-Актив»** входит: деионизированная вода, сорбитол, диоксид кремния, L-аргинин, монофторфосфат, антибактериальная добавка, увлажнитель, пищевой ароматизатор.

Гель **«Десенсил-Актив»** надежно закрывает дентинные канальца, полностью блокирует болевые ощущения, обладает быстрым действием и пролонгированным эффектом.

Кроме того, гель **«Десенсил-Актив»** обладает щадящими полирующими свойствами, не меняет текстуру поверхности зубной эмали и стоматологических реставрационных материалов.

Гель **«Десенсил-Актив»** может использоваться как до, так и после стоматологических процедур, таких как профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка зубов), отбеливание, препарирование зубов при ортопедическом лечении, и других терапевтических стоматологических манипуляциях.

При регулярном использовании гель **«Десенсил-Актив»** создает долговременный барьер, защищающий от повышенной чувствительности зубов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

В условиях стоматологического кабинета необходимое количество материала нанести на чувствительные зоны зубов при помощи роторной чашечки или любого чистящего инструмента. Обработку провести на низких оборотах в течение 30-60 секунд, затем промыть водой.

При повседневном применении, в лечебно-профилактических целях нанести материал на зубную щетку с мягкой щетиной и обработать ею все чувствительные зоны зубов. Использовать гель дважды в день или согласно рекомендации стоматолога.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель (туба) - 10 мл

Инструкция по применению - 1 шт.

Картонная упаковка - 1 шт.

Допускается выпуск геля «Десенсил-Актив» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом **темном** месте при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Срок годности – **2 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки геля «Десенсил-Актив» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13731 от 23.10.2017 г.